

NAVODILO ZA UPORABO

Claritine 5 mg/5 ml sirup

loratadin

Pred uporabo natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

- Zdravilo je na voljo brez recepta. Kljub temu ga morate jemati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristilo.
- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se s farmacevtom če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če se znaki vaše bolezni ne izboljšajo v 10 dneh, se posvetujte z zdravnikom. Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Claritine in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Claritine
3. Kako uporabljati zdravilo Claritine
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Claritine
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO CLARITINE IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Loratadin je zdravilo iz skupine antihistaminikov. Pri alergijski reakciji se sproščajo različne snovi, zaradi katerih se pojavijo simptomi alergijske reakcije. Najpomembnejši je histamin. Zdravilo Claritine zavre delovanje histamina in deluje protialergijsko.

Zdravilo Claritine odpravlja simptome alergijskega rinitisa (na primer seneni nahod), kot so kihanje, izcedek iz nosu ali srbenje v nosu ter pečenje ali srbenje v očeh. Zdravilo Claritine se lahko uporablja tudi za zdravljenje urtikarije (koprivnice), ki je alergijska kožna motnja.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO CLARITINE

Samozdravljenje z zdravilom Claritine je primerno za odrasle in mladostnike, stare več kot 12 let. Zdravljenje pri mladostnikih naj nadzorujejo starši.

Ne jemljite zdravila Claritine

- če ste alergični (preobčutljivi) na loratadin ali katerikoli sestavino zdravila Claritine.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Claritine

- če imate motnje v delovanju jeter
- Bolnikom, ki morajo opraviti preiskave kožne preobčutljivosti, priporočamo, da zdravilo prenehajo jemati vsaj dva dneva prej, ker lahko zdravilo Claritine prekrije znake preobčutljivosti.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Jemanje zdravila Claritine skupaj s hrano in pijačo

Loratadin ne zveča učinkov alkohola.

Sirup lahko vzamete neodvisno od obroka

Nosečnost in dojenje

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Varnosti uporabe loratadina med nosečnostjo niso ugotovili. Med nosečnostjo ne svetujemo uporabe zdravila Claritine tablete.

Uporabo zdravila Claritine tablete ne svetujemo med dojenjem, ker se loratadin izloča v mleko doječih mater.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Loratadin v priporočenih odmerkih ne vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev. Če pa postanete zaspani, se izogibajte vožnji ali upravljanju s stroji, dokler zaspanost ne mine.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Claritine

Zdravilo Claritine sirup pri odmerku 10 ml vsebuje 6 g saharoze. To morajo upoštevati sladkorni bolniki. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO CLARITINE

Zdravilo jemljite natančno v skladu z navodili zdravnika ali farmacevta. Ne jemljite več zdravila Claritine kot je priporočeno na ovojnicah, in ne jemljite ga pogosteje, kot je priporočeno.

Odrasli in otroci, starejši od 12 let:

10 ml (dve žlički) zdravila Claritine sirup enkrat na dan. Sirup lahko vzamete neodvisno od obroka.

Otroci, stari 2 do 12 let – odmerjanje glede na telesno težo:

Telesna teža več kot 30 kg:

10 ml (dve žlički) zdravila Claritine sirup enkrat na dan.

Telesna teža 30 kg ali manj:

5 ml (ena žlička) zdravila Claritine sirup enkrat na dan.

Učinkovitosti in varnosti zdravila Claritine še niso ugotovili pri otrocih, mlajših od 2 let.

Bolnikom s hudo jetno okvaro morate dati manjši začetni odmerek, ker imajo lahko zmanjšan očistek loratadina. Priporočeni začetni odmerek za odrasle in otroke, ki so težji od 30 kg je 10 ml (2 žlički) vsak drugi dan in 5 ml (1 žlička) vsak drugi dan za otroke, ki so težki 30 kg ali manj.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Claritine kot bi smeli

Če ste vzeli prevelik odmerek zdravila, takoj obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Preveliki odmerki lahko povzročijo zaspanost, glavobol in hitro utripanje srca.

Če ste pozabili vzeti odmerek zdravila Claritine

Če ste pozabili pravočasno vzeti odmerek zdravila, ga vzemite čimprej, potem pa nadaljujte s svojim rednim režimom odmerjanja. Ne vzemite dvojnega odmerka, če ste pozabili vzeti prejšnji odmerek.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Claritine neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Neželeni učinki se lahko pojavijo z določeno pogostnostjo, ki je opredeljena na naslednji način:

Zelo pogosti:	pojavi se pri več kot 1 od 10 bolnikov
Pogosti:	pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 100 bolnikov
Občasni:	pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 1.000 bolnikov
Redki:	pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 10.000 bolnikov
Zelo redki:	pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
Neznana:	pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Razporeditev po organskih sistemih
Bolezni imunskega sistema

Neželeni učinki

anafilaksa (huda preobčutljivostna reakcija, ki lahko ogrozi življenje)

Bolezni živčevja
Srčne bolezni

omotica
tahikardija (pospešeno bitje srca), palpitacije (neprijetni občutki ob hitrem in močnem utripanju srca)

Bolezni prebavil

občutek siljenja na bruhanje, suha usta, gastritis (vnetje želodčne sluznice)

Bolezni jeter, žolčnika in žolčevodov

nenormalna funkcija jeter

Bolezni kože in podkožja

izpuščaji, izpadanje las

Splošne težave in sprememba na mestu aplikacije

utrujenost

V priporočenem odmerku zdravilo Claritine običajno ne povzroča suhih ust ali zaspanosti.

Najpogosteje so poročali o naslednjih neželenih učinkih: glavobol, utrujenost, živčnost, somnolenca, povečan apetit in nespečnost.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA CLARITINE

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25°C!

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake »Uporabno do«. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte zdravila Claritine, če ste opazili kakršnekoli spremembe v sirupa.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Claritine

Zdravilna učinkovina je loratadin. vsebuje 10 mg loratadina.

Pomožne snovi so:

propilenglikol,

glicerol,

citronska kislina, brezvodna (za uravnavanje pH),

natrijev benzoat,

saharoza,

umetna aroma breskve

prečiščena voda

Izgled zdravila Claritine in vsebina pakiranja

Zdravilo Claritine sirup je pakirano v škatlo s steklenico iz temnega stekla po 120 ml.

Merilna žlička je priložena v škatli.

Način in režim izdaje zdravila Claritine

BRp – Izdaja zdravila je brez recepta v lekarnah.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Schering-Plough Europe, Rue de Stalle 73, Bruselj, Belgija, Tel.: 0032 2 370 92 51, Fax 0032 332 2185

Izdelovalec

SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Bruselj, Belgija

Navodilo je bilo odobreno

04.11.2010

Za vse informacije o tem zdravilu se obrnite na lokalnega zastopnika imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.