

NAVODILO ZA UPORABO

Cozaar 12,5 mg filmsko obložene tablete
Cozaar 50 mg filmsko obložene tablete
Cozaar 100 mg filmsko obložene tablete
kalijev losartanat

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Cozaar in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Cozaar
3. Kako jemati zdravilo Cozaar
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Cozaar
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO COZAAR IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Losartan (COZAAR) spada v skupino zdravil, imenovanih antagonisti receptorjev angiotenzina II. Angiotenzin II nastaja v telesu. Veže se na receptorje v krvnih žilah in tako povzroči, da se zožijo. Na ta način se krvni tlak zviša. Losartan preprečuje vezavo angiotenzina II na te receptorje in tako povzroči, da se žile sprostijo in se krvni tlak zniža. Losartan upočasni pešanje ledvic pri bolnikih z visokim krvnim tlakom in s sladkorno boleznijo tipa 2.

Zdravilo Cozaar se uporablja:

- za zdravljenje odraslih ter otrok in mladostnikov, starih 6-18 let, z visokim krvnim tlakom (hipertenzijo).
- za zaščito ledvic pri bolnikih s hipertenzijo in s sladkorno boleznijo tipa 2, pri katerih so laboratorijski izvidi pokazali okvaro ledvic in proteinurijo $\geq 0,5$ g na dan (stanje s preveliko količino beljakovin v urinu).
- za zdravljenje bolnikov s kroničnim srčnim popuščanjem, če zdravnik meni, da zdravljenje z zaviralci angiotenzinske konvertaze (zaviralci ACE, zdravila za zniževanje krvnega tlaka) ni primerno. Če je srčno popuščanje stabilno ob zdravljenju z zaviralcem ACE, vam zdravnik zdravila ne sme zamenjati za losartan.
- pri bolnikih z visokim krvnim tlakom in zadebeljenim levim prekatom; izkazalo se je, da zdravilo Cozaar zmanjša tveganje za možgansko kap ("indikacija iz študije LIFE").

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO COZAAR

Ne jemljite zdravila Cozaar:

- če ste alergični (preobčutljivi) na losartan ali katerokoli sestavino zdravila,
- če imate hudo okvaro jeter,
- če ste noseči več kot tri mesece (zdravilu Cozaar se je bolje izogibati tudi v zgodnji nosečnosti - glejte Nosečnost).

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Cozaar

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če bi lahko zanosili). Zdravila Cozaar ne priporočamo v zgodnji nosečnosti. Če pa ste noseči več kot tri mesece, zdravila Cozaar ne smete jemati, saj lahko v tem času povzroči resne okvare ploda (glejte poglavje o nosečnosti).

Preden vzamete zdravilo Cozaar, je pomembno, da poveste zdravniku:

- če ste kdaj imeli angioedem (otekanje obraza, ustnic, grla in/ali jezika) (glejte tudi poglavje 4 "Možni neželeni učinki").
- če močno bruhaate ali imate hudo drisko in zato izgubljate veliko tekočine in/ali soli.
- če jemljete diuretike (zdravila, ki povečajo izločanje vode skozi ledvice) ali ste na dieti s hrano z zmanjšano količino soli, zaradi česar iz telesa izgubljate večje količine tekočine in soli (glejte poglavje 3 "Odmerjanje pri posebnih skupinah bolnikov").
- če veste, da imate zožanje ali zaprtje krvnih žil, ki vodijo do ledvic, ali če so vam pred kratkim presadili ledvico,
- če imate okvaro jeter (glejte poglavje 2 "Ne jemljite zdravila Cozaar" in poglavje 3 "Odmerjanje pri posebnih skupinah bolnikov").
- če imate srčno popuščanje z okvaro ledvic ali brez ali sočasne hude življenjsko nevarne srčne aritmije. Posebna previdnost je potrebna, če sočasno jemljete beta zaviralec.
- če imate težave s srčnimi zaklopkami ali srčno mišico.
- če imate koronarno srčno bolezen (zaradi zmanjšane krvnega obtoka v srčnih žilah) ali možganskožilno bolezen (zaradi zmanjšane krvnega obtoka v možganih).
- če imate primarni hiperaldosteronizem (sindrom povezan s povečanim izločanjem hormona aldosterona iz nadledvične žleze zaradi okvare znotraj žleze).

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, vključno s tistimi, ki ste jih dobili brez recepta ali z zdravili rastlinskega izvora in naravnimi izdelki.

Še posebej pozorni bodite, če med zdravljenjem z zdravilom Cozaar jemljete katero od naslednjih zdravil:

- druga zdravila za zniževanje krvnega tlaka, ker lahko še dodatno znižajo vaš krvni tlak. Krvni tlak vam lahko zniža tudi katero od naslednjih zdravil/skupin zdravil: triciklični antidepresivi, antipsihotiki, baklofen, amifostin.
- zdravila, ki zadržujejo kalij ali lahko povečajo količino kalija (npr. dodatki kalija, nadomestki soli, ki vsebujejo kalij, zdravila, ki varčujejo kalij, kot so določeni diuretiki [amilorid, triamteren, spironolakton], ali heparin).
- nesteroidne antirevmatike, kot je indometacin, vključno z zaviralci COX-2 (zdravila, ki zdravijo vnetje in se lahko uporabljajo za lajšanje bolečine), ker lahko zmanjšajo losartanov učinek znižanja krvnega tlaka.

Če imate ledvično okvaro, lahko sočasna uporaba teh zdravil vodi do dodatnega poslabšanja ledvične funkcije.

Zdravila, ki vsebujejo litij, se v kombinaciji z losartanom brez natančnega nadzora zdravnika ne smejo uporabljati. V poštev lahko pridejo posebni previdnostni ukrepi (npr. krvni testi).

Jemanje zdravila Cozaar skupaj s hrano in pijačo

Zdravilo Cozaar lahko vzamete s hrano ali na tešče.

Nosečnost in dojenje

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če bi lahko zanosili). Običajno vam bo zdravnik svetoval, da prekinete z jemanjem zdravila Cozaar, še preden zanosite ali takoj, ko ugotovite, da ste noseči. Namesto zdravila Cozaar vam bo svetoval drugo zdravilo. Zdravila Cozaar ne

priporočamo v zgodnji nosečnosti. Če pa ste noseči več kot tri mesece, zdravila Cozaar ne smete jemati, saj lahko od tretjega meseca nosečnosti naprej povzroči resne okvare ploda.

Dojenje

Zdravniku povejte, če dojite ali nameravate dojiti. Zdravila Cozaar ne priporočamo doječim materam. Če želite dojiti, vam zdravnik lahko spremeni zdravljenje, zlasti če je vaš otrok novorojenec ali nedonošenec.

Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Zdravilo Cozaar so preizkušali pri otrocih. Za več informacij prosite zdravnika.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Študij o vplivu na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji niso izvedli. Zelo malo verjetno je, da bi zdravilo Cozaar vplivalo na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Vendar pa lahko losartan tako kot tudi veliko drugih zdravil za zdravljenje visokega krvnega tlaka pri nekaterih bolnikih povzroči omotico ali zaspanost. Če ste omotični ali zaspani, se, preden se lotite teh aktivnosti, posvetujte z zdravnikom.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Cozaar

Zdravilo Cozaar vsebuje laktozo monohidrat. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO COZAAR

Pri jemanju zdravila Cozaar natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Zdravnik vam bo predpisal ustrezen odmerek zdravila Cozaar glede na vaše stanje in glede na to, ali jemljete še katera druga zdravila. Pomembno je, da nadaljujete z jemanjem zdravila Cozaar tako dolgo, kot vam je predpisal zdravnik. Tako vzdržujete enakomeren nadzor krvnega tlaka.

Odrasli bolniki z visokim krvnim tlakom

Zdravljenje se običajno začne s 50 mg losartana (ena tableta Cozaar 50 mg) enkrat na dan. Največji učinek zmanjšanja krvnega tlaka naj bi bil dosežen 3-6 tednov po začetku zdravljenja. Pri nekaterih bolnikih se odmerek kasneje lahko poveča na 100 mg losartana (dve tableti Cozaar 50 mg) enkrat na dan.

Če imate občutek, da je učinek losartana premočan ali prešibek, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih (starih 6 do 18 let)

Priporočeni začetni odmerek pri bolnikih, ki tehtajo med 20 in 50 kg, je 0,7 mg losartana na kg telesne teže enkrat na dan (do 25 mg zdravila COZAAR). Zdravnik lahko odmerek poveča, če tlak ni pod nadzorom.

Odrasli bolniki z visokim krvnim tlakom in s sladkorno boleznijo tipa 2

Zdravljenje se običajno začne s 50 mg losartana (ena tableta Cozaar 50 mg) enkrat na dan. Odmerek se kasneje lahko poveča na 100 mg losartana (dve tableti Cozaar 50 mg) enkrat na dan, glede na odziv krvnega tlaka.

Losartan se lahko jemlje skupaj z drugimi zdravili za zniževanje krvnega tlaka (npr. diuretiki, zaviralci kalcijevih kanalčkov, alfa ali beta zaviralci in zdravili, ki delujejo na centralno živčevje), kot tudi z insulinom in drugimi običajno uporabljenimi zdravili za zmanjševanje količine glukoze v krvi (npr. sulfonilsečnine, glitazoni, zaviralci glukozidaze).

Odrasli bolniki s srčnim popuščanjem

Zdravljenje se običajno začne z 12,5 mg losartana (ena tableta Cozaar 12,5 mg) enkrat na dan. Večinoma je treba odmerek povečati postopoma, tedensko (tj. 12,5 mg na dan prvi teden, 25 mg na dan drugi teden, 50 mg na dan tretji teden, 100 mg na dan četrti teden, 150 mg na dan peti teden) do vzdrževalnega odmerka, ki ga določi vaš zdravnik. Lahko boste dobili največji odmerek, in sicer 150 mg losartana (na primer tri tablete Cozaar 50 mg ali eno tableto Cozaar 100 mg in eno tableto Cozaar 50 mg) enkrat na dan.

Pri zdravljenju srčnega popuščanja se losartan običajno kombinira z diuretikom (zdravilo, ki poveča količino vode, ki se izloči skozi ledvice) in/ali digitalisom (zdravilo, ki pripomore, da je srce močnejše in učinkovitejše) in/ali beta zaviralcem.

Odmerjanje pri posebnih skupinah bolnikov

Zdravnik lahko predlaga manjši odmerek predvsem na začetku zdravljenja določenih bolnikov, kot so tisti, ki se zdravijo z velikimi odmerki diuretikov, bolniki z okvaro jeter ali bolniki, starejši od 75 let. Uporabe losartana ne priporočamo za bolnike s hudo okvaro jeter (glejte poglavje "Ne jemljite zdravila Cozaar").

Jemanje zdravila

Tablete morate pogoltniti s kozarcem vode. Dnevni odmerek poskusite vzeti vsak dan ob približno istem času. Pomembno je, da nadaljujete z jemanjem zdravila Cozaar, dokler vam zdravnik ne naroči drugače.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Cozaar, kot bi smeli

Če slučajno vzamete preveč tablet, se takoj posvetujte z zdravnikom. Simptomi prevelikega odmerjanja so nizek krvni tlak, povišan srčni utrip, mogoče zmanjšan srčni utrip.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Cozaar

Če ste slučajno pozabili vzeti dnevni odmerek, vzemite naslednjega kot običajno. Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadomestili pozabljenega.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Cozaar neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Tablete z losartanom takoj prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom ali pa takoj pojdite na urgenco, če se pri vas pojavi kaj od sledečega:

Huda alergijska reakcija (izpuščaj, srbenje, otekanje obraza, ustnic, ust ali žrela, ki lahko oteži požiranje ali dihanje). To je resen vendar redek neželeni učinek, ki se pojavi pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov. Lahko da potrebujete nujno zdravniško pomoč ali zdravljenje v bolnišnici.

Neželeni učinki so razvrščeni takole:

| | |
|----------------------|--|
| zelo pogosti: | pojavi se pri več kot 1 od 10 bolnikov |
| pogosti: | pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 100 bolnikov |
| občasni: | pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 1.000 bolnikov |
| redki: | pojavi se pri 1 do 10 bolnikih od 10.000 bolnikov |
| zelo redki: | pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov |
| neznana: | pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti |

Poročali so o naslednjih neželenih učinkih zdravila Cozaar:

Pogosti:

- omotica,
- nizek krvni tlak,
- slabotnost,
- utrujenost,
- premalo sladkorja v krvi (hipoglikemija),
- preveč kalija v krvi (hiperkaliemija),
- spremembe v delovanju ledvic, vključno z ledvično odpovedjo,
- zmanjšano število rdečih krvnih celic (anemija),
- zvišane vrednosti sečnine v krvi, kreatinina v serumu in kalija v serumu pri bolnikih s srčnim popuščanjem.

Občasni:

- zaspanost,
- glavobol,
- motnje spanja,
- občutek pospešenega bitja srca (palpitacije),
- huda bolečina v prsnem košu (angina pectoris),
- nizek krvni tlak (posebno po veliki izgubi vode iz telesa in zato tudi iz krvnih žil, npr. pri bolnikih s hudim srčnim popuščanjem ali pri bolnikih, zdravljenih z velikimi odmerki diuretikov),
- od odmerka odvisni ortostatski učinki, kot je padec krvnega tlaka, ko vstanete iz ležečega ali sedečega položaja,
- kratka sapa (dispneja),
- bolečine v trebuhu,
- zaprtje,
- driska,
- siljenje na bruhanje,
- bruhanje,
- koprivnica (urtikarija),
- srbenje (pruritus),
- izpuščaji,
- lokalizirano zatekanje (edem),
- kašelj.

Redki:

- preobčutljivost,
- angioedem,
- vnetje krvnih žil (vaskulitis, vključno s Henoch-Schonlein purpuro),
- odrevenelost ali mravljinčenje (parestezija),
- omedlevica (sinkopa),
- zelo hitro in neredno bitje srca (atrijska fibrilacija),
- možganska kap,
- vnetje jeter (hepatitis),
- povečana količina alaninaminotransferaze (ALT) v krvi, ki se po prekinitvi zdravljenja običajno popravi.

Neznana:

- zmanjšano število trombocitov,
- migrena,
- nenormalno delovanje jeter,
- bolečine v mišicah in sklepih,
- gripi podobni simptomi,

- bolečine v hrbtu in okužba urinarnega trakta,
- povečana občuljivost na sonce (fotosenzitivnost),
- nepojasnjena bolečina v mišicah, skupaj s temnim urinom (rabdomioliza),
- impotenca,
- vnetje trebušne slinavke (pankreatitis),
- nizke vrednosti natrija v krvi (hiponatriemija),
- depresija,
- splošno slabo počutje,
- zvonjenje, šumenje, brenčanje v ušesih (tinitus).

Neželeni učinki pri otrocih so podobni tistim, ki so jih opazili pri odraslih.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA COZAAR

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Cozaar ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli ali plastenki. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Pretisni omoti:

Zdravilo Cozaar shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago. Pretisnega omota ne odprite, dokler niste pripravljene vzeti zdravila.

Plastenke:

Zdravilo Cozaar shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. Shranjujte pri temperaturi do 25 °C. Platenko shranjujte tesno zaprto za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Cozaar

Zdravilna učinkovina je kalijev losartanat.

Ena Cozaar 12,5 mg tableta vsebuje 12,5 mg kalijevega losartanata.

Ena Cozaar 50 mg tableta vsebuje 50 mg kalijevega losartanata.

Ena Cozaar 100 mg tableta vsebuje 100 mg kalijevega losartanata.

Pomožne snovi so: mikrokristalna celuloza (E460), laktoza monohidrat, predgeliran koruzni škrob, magnezijev stearat (E572), hidroksipropilceluloza (E463), hipromeloza (E464).

Cozaar 12,5 mg, 50 mg in 100 mg tablete vsebujejo kalij v naslednjih količinah: 1,06 mg (0,027 mEq), 4,24 mg (0,108 mEq) oz. 8,48 mg (0,216 mEq).

Cozaar 12,5 mg tablete vsebujejo tudi karnauba vosek (E903), titanov dioksid (E171), indigotin (E132).

Cozaar 50 mg tablete vsebujejo tudi karnauba vosek (E903), titanov dioksid (E171).

Cozaar 100 mg tablete vsebujejo tudi karnauba vosek (E903), titanov dioksid (E171).

Izgled zdravila Cozaar in vsebina pakiranja

Zdravilo Cozaar 12,5 mg je na voljo v obliki filmsko obloženih tablet brez razdelilne zareze, ki vsebujejo 12,5 mg kalijevega losartanata.

Zdravilo Cozaar 50 mg je na voljo v obliki filmsko obloženih tablet z razdelilno zarezo, ki vsebujejo 50 mg kalijevega losartanata. Tableto se lahko razdeli na enaki polovici.

Zdravilo Cozaar 100 mg je na voljo v obliki filmsko obloženih tablet brez razdelilne zareze, ki vsebujejo 100 mg kalijevega losartanata.

Zdravilo Cozaar je na voljo v naslednjih pakiranjih:

- Cozaar 12,5 mg: PVC/PE/PVDC pretisni omoti s prevleko iz aluminijaste folije v pakiranjih po 7, 14, 21, 28, 50, 98, 210 ali 500 tablet in enoodmerna pakiranja po 28 tablet za bolnišnično uporabo. HDPE plastenke po 100 tablet.
- Cozaar 50 mg: PVC/PE/PVDC pretisni omoti s prevleko iz aluminijaste folije v pakiranjih po 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98, 280 ali 500 tablet in enoodmerna pakiranja po 28, 56 in 98 tablet za bolnišnično uporabo. HDPE plastenke po 100 ali 300 tablet.
- Cozaar 100 mg: PVC/PE/PVDC pretisni omoti s prevleko iz aluminijaste folije v pakiranjih po 7, 10, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 ali 280 tablet in enoodmerna pakiranja po 28, 56 in 98 tablet za bolnišnično uporabo. HDPE plastenke po 100 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdaje zdravila Cozaar

Rp – Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Slovenija

Izdelovalec zdravila

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
Postbus 581
2031 BN Haarlem
Nizozemska

To zdravilo je v državah članicah EGP odobreno pod naslednjimi imeni:

Država članica Ime zdravila

| | |
|----------|--------------------------------|
| Avstrija | COSAAR 12,5 mg - Filmtabletten |
| Avstrija | COSAAR 50 mg - Filmtabletten |
| Avstrija | COSAAR 100 mg - Filmtabletten |
| Belgija | COZAAR 100 mg |
| Belgija | COZAAR 50 MG |
| Belgija | COZAAR 12,5 mg |

| | |
|-------------|--|
| Belgija | LOORTAN 100 mg |
| Belgija | LOORTAN 50 mg |
| Belgija | LOORTAN 12,50 mg |
| Bolgarija | COZAAR |
| Ciper | COZAAR |
| Danska | Cozaar |
| Estonija | COZAAR, COZAAR 12,5 mg |
| Finska | COZAAR 50 mg |
| Finska | COZAAR 100 mg |
| Francija | COZAAR 100 mg film-coated tablets |
| Francija | COZAAR 50 mg scored coated tablets |
| Grčija | COZAAR |
| Irska | COZAAR 50 mg Film-coated Tablets |
| Irska | COZAAR 100 mg Film-coated Tablets |
| Irska | COZAAR 12.5mg Film-coated Tablets |
| Italija | LORTAAN 50 mg compresse rivestite con film |
| Italija | LORTAAN 12,5 mg compresse rivestite con film |
| Italija | LORTAAN 100 mg compresse rivestite con film |
| Italija | NEO-LOTAN 50 mg compresse rivestite con film |
| Italija | NEO-LOTAN 12,5 mg compresse rivestite con film |
| Italija | NEO-LOTAN 100 mg compresse rivestite con film |
| Italija | LOSAPREX 50 mg compresse rivestite con film |
| Italija | LOSAPREX 12,5 mg compresse rivestite con film |
| Italija | LOSAPREX 100 mg compresse rivestite con film |
| Latvija | COZAAR 50 mg film-coated tablets |
| Latvija | COZAAR 100 mg film-coated tablets |
| Litva | COZAAR (Losartan) |
| Luksemburg | COZAAR 100 mg |
| Luksemburg | COZAAR 50 MG |
| Luksemburg | COZAAR 12,5 mg |
| Luksemburg | LOORTAN 100 mg |
| Luksemburg | LOORTAN 50 mg |
| Luksemburg | LOORTAN 12,50 mg |
| Madžarska | COZAAR |
| Malta | COZAAR 12,5, 50 and 100 mg film-coated tablets |
| Nemčija | CARDOPAL START 12,5 mg Filmtabletten |
| Nemčija | LORZAAR 100 mg Filmtabletten |
| Nemčija | LORZAAR 50 mg Filmtabletten |
| Nemčija | LORZAAR PROTECT 100 mg Filmtabletten |
| Nemčija | LORZAAR PROTECT 50 mg Filmtabletten |
| Nemčija | LORZAAR START 12,5 mg Filmtabletten |
| Nemčija | PINZAAR 100 mg Filmtabletten |
| Nemčija | PINZAAR 50 mg Filmtabletten |
| Nemčija | LORZAAR VARIPHARMSTART 12,5 mg Filmtabletten |
| Nizozemska | COZAAR 50 |
| Nizozemska | COZAAR 100 |
| Poljska | COZAAR |
| Portugalska | COZAAR |
| Portugalska | COZAAR 100 mg |
| Portugalska | COZAAR IC |

| | |
|------------------|---|
| Portugalska | LORTAAN IC |
| Portugalska | LORTAAN |
| Portugalska | LORTAAN 100mg |
| Romunija | COZAAR, comprimate filmate, 50 mg |
| Slovenija | COZAAR 12,5 mg filmsko obložene tablete |
| Slovenija | COZAAR 50 mg filmsko obložene tablete |
| Slovenija | COZAAR 100 mg filmsko obložene tablete |
| Španija | COZAAR 12,5 mg Inicio |
| Španija | COZAAR 50 mg |
| Španija | COZAAR 100 mg |
| Švedska | COZAAR 12,5 mg filmdragerade tabletter |
| Švedska | COZAAR 50 mg filmdragerade tabletter |
| Švedska | COZAAR 100 mg filmdragerade tabletter |
| Velika Britanija | COZAAR 50 MG FILM-COATED TABLETS |
| Velika Britanija | COZAAR 100MG FILM-COATED TABLETS |
| Islandija | COZAAR |
| Norveška | COZAAR |

Navodilo je bilo odobreno: 11/2010