

## NAVODILO ZA UPORABO

### Diprosalic 0,5 mg/30 mg v 1 g mazilo betametazon/salicilna kislina

#### **Pred uporabo natančno preberite navodilo!**

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

#### **Navodilo vsebuje:**

1. Kaj je zdravilo Diprosalic mazilo in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Diprosalic mazilo
3. Kako uporabljati zdravilo Diprosalic mazilo
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Diprosalic mazilo
6. Dodatne informacije

## **1. KAJ JE ZDRAVILO DIPROSALIC MAZILO IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO**

Zdravilo Diprosalic mazilo lahko uporabljamo za lajšanje vnetja, suhosti, srbenja, alergij in neprijetnega občutka, ki se lahko pojavi pri psoriazi (luskavica, je vnetna kronična kožna bolezen z značilnimi kožnimi žarišči), seboreji (kožna bolezen za katero je značilno veliko izločanje maščobe), ekcemu (alergijska kožna bolezen z rdečim in srbečim izpuščajem), dermatitisu (vnetje kože, ki ga povzročijo zunanji dejavniki) in drugih boleznih kože ali lasišča, ki se odzivajo na glukokortikoidna zdravila. Zdravilo Diprosalic mazilo ima tudi keratolitično delovanje (lušči poroženele plasti pokožnice).

## **2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO DIPROSALIC MAZILO**

#### **Ne uporabljajte zdravila Diprosalic mazilo:**

- če ste alergični (preobčutljivi) na betametazon ali salicilno kislino ali katerokoli sestavino zdravila Diprosalic mazilo,
- če imate akne (pogosta bolezen kože zaradi zamažitve žlez lojnic), rosaceae (bolezen kože obraza z rdečino, papulami in gnojnimi mehurčki ter razširjenimi kapilarami), kožne ulkuse (razjede na koži), virusne in glivične infekcije.

#### **Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Diprosalic mazilo:**

- izogibajte se dolgotrajni uporabi in uporabi na velikih površinah kože,
- izogibajte se nanašanju zdravila Diprosalic mazilo na odprte rane ali poškodovano kožo,
- to zdravilo je namenjeno le uporabi na koži,
- izogibajte se stiku zdravila z očmi, sluznicami (npr. usta ali notranjost nosu) in predelu pod pleniciami,
- če imate virusne in glivične infekcije,
- če imate bronhialno astmo,
- če se pri uporabi pojavi preobčutljivostna reakcija (ker obstaja velika verjetnost, da ste preobčutljivi na salicilate).

Posvetujte se s svojim zdravnikom, če se spremembe na koži poslabšajo ali so videti okužene ali prekomerno izsušene.

### **Jemanje drugih zdravil**

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

### **Nosečnost in dojenje**

Pred uporabo zdravila Diprosalic mazilo povejte svojemu zdravniku, če ste noseči. Zdravila ne smete uporabljati pogosteje ali dlje časa, kot priporoča vaš zdravnik.

Pred uporabo zdravila Diprosalic mazilo povejte svojemu zdravniku, če dojite. Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

### **Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev**

Zdravilo Diprosalic mazilo ne vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

## **3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO DIPROSALIC MAZILO**

Pri uporabi zdravila Diprosalic mazilo natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nanesite tanko plast zdravila Diprosalic mazilo na prizadeti predel in ga nežno vtrite v kožo ali lasišče, običajno dvakrat na dan (zjutraj in zvečer) oz. po navodilih vašega zdravnika. Zdravljenega predela ne povijajte s povojem ali s čim drugim, razen če vam tako naroči zdravnik. Po uporabi tega zdravila si umijte roke.

### **Če ste uporabili večji odmerek zdravila Diprosalic mazilo, kot bi smeli**

Zdravilo Diprosalic mazilo uporabljajte le v priporočenem odmerku. Če ste zdravilo uporabili v velikih količinah ali dlje, kot je predpisano, se obrnite na svojega zdravnika.

### **Če ste pozabili uporabiti zdravilo Diprosalic mazilo**

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Diprosalic mazilo v skladu z navodili, ga nanesite čimprej, potem pa nadaljujte z rednim režimom odmerjanja.

Zdravnik vam bo svetoval, kdaj prenehajte uporabljati zdravilo Diprosalic mazilo.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

## **4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI**

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Diprosalic mazilo neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zelo pogosti:	pojavi se pri več kot 1 od 10 bolnikov
Pogosti:	pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 100 bolnikov
Občasni:	pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 1.000 bolnikov
Redki:	pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 10.000 bolnikov
Zelo redki:	pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
Neznana:	pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Četudi ni nujno, da se bodo pojavili vsi navedeni neželeni učinki, boste lahko potrebovali zdravniško pomoč, če se pojavijo. Posvetujte se s svojim zdravnikom, če kateri od naslednjih neželenih učinkov traja ali je moteč (neznana pogostnost): občutek pečenja, srbenje, draženje, suha koža, folikulitis (bakterijska okužba lasnega mešička v koži), hipertrichoza (povečana poraščenost), aknam podobni izpuščaji, hipopigmentacija (telo ne proizvaja pigmenta), teleangiektazije (popokane žilice), perioralni

dermatitis (kožno vnetje okoli ust), alergijski kontaktni dermatitis (vnetje kože, ki pride v neposreden stik s škodljivo snovjo), maceracija kože (zmehčana koža), atrofija kože (tanjša koža), strije (rožnate črte na koži), miliaria (kožni osip zaradi zamašenih žlez lojnic), sekundarne okužbe.

Otroke in mladostnike, ki morajo uporabljati to zdravilo, naj skrbno spremlja njihov zdravnik, ker se to zdravilo absorbira skozi kožo in lahko vpliva na rast ali povzroči druge neželene učinke.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

## **5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA DIPROSALIC MAZILO**

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake Uporabno do:. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte zdravila Diprosalic mazilo, če ste opazili kakršnekoli spremembe v videzu mazila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

## **6. DODATNE INFORMACIJE**

### **Kaj vsebuje zdravilo Diprosalic mazilo**

Zdravilni učinkovini sta: betametazon in salicilna kislina  
Pomožne snovi so: tekoči parafin, beli vazelin

### **Izgled zdravila Diprosalic mazilo in vsebina pakiranja**

Mazilo je bele do umazano bele barve, motno in brez delcev.

Zdravilo Diprosalic mazilo je pakirano v škatle z aluminijasto tubo po 30 g in 50 g.

### **Način in režim izdaje zdravila**

Rp-Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

### **Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom**

Schering-Plough Europe, Rue de Stalle 73, Bruselj, Belgija

### **Izdelovalec**

SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija

### **Navodilo je bilo odobreno**

11.06.2010

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.