

NAVODILO ZA UPORABO

Diprosalic 0,5 mg/20 mg v 1 g dermalna raztopina betametazon/salicilna kislina

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Diprosalic dermalna raztopina in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste uporabili zdravilo Diprosalic dermalna raztopina
3. Kako uporabljati zdravilo Diprosalic dermalna raztopina
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Diprosalic dermalna raztopina
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO DIPROSALIC DERMALNA RAZTOPINA IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Diprosalic dermalna raztopina lahko uporabljamo za lajšanje vnetja, suhosti, srbenja, alergij in neprijetnega občutka, ki se lahko pojavi pri psoriazii (luskavica, je vnetna kronična kožna bolezen z značilnimi kožnimi žarišči), seboreji (kožna bolezen za katero je značilno veliko izločanje maščobe), ekcemu (alergijska kožna bolezen z rdečim in srbečim izpuščajem), dermatitisu (vnetje kože, ki ga povzročijo zunanji dejavniki) in drugih boleznih kože ali lasišča, ki se odzivajo na glukokortikoidna zdravila.

Zdravilo Diprosalic dermalna raztopina ima tudi keratolitično delovanje (lušči poroženele plasti pokožnice).

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI ZDRAVILO DIPROSALIC DERMALNA RAZTOPINA

Ne uporabljajte zdravila Diprosalic dermalna raztopina:

- če ste alergični (preobčutljivi) na betametazon ali salicilno kislino ali katerikoli sestavino zdravila Diprosalic dermalna raztopina,
- če imate akne (pogosta bolezen kože zaradi zamašitve žlez lojnic), rosaceae (bolezen kože obraza z rdečino, papulami in gnojnimi mehurčki ter razširjenimi kapilarami), kožni ulkusi (razjede na koži), virusne in glivične infekcije.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Diprosalic dermalna raztopina:

- izogibajte se dolgotrajni uporabi in uporabi na velikih površinah kože,
- izogibajte se nanašanju zdravila Diprosalic dermalna raztopina na odprte rane ali poškodovano kožo,
- to zdravilo je namenjeno le uporabi na koži ali lasišču,
- izogibajte se stiku zdravila z očmi, sluznicami (npr. usta ali notranjost nosu) in predelu pod plenici,
- če imate virusne in glivične infekcije,
- če imate bronhialno astmo,

- če se pri uporabi pojavi preobčutljivostna reakcija (ker obstaja velika verjetnost, da ste preobčutljivi na salicilate).

Posvetujte se s svojim zdravnikom, če se spremembe na koži ali lasišču poslabšajo ali so videti okužene ali prekomerno izsušene.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Nosečnost in dojenje

Pred uporabo zdravila Diprosalic dermalna raztopina povejte svojemu zdravniku, če ste noseči. Zdravila ne smete uporabljati pogosteje ali dlje časa, kot priporoča vaš zdravnik.

Pred uporabo zdravila Diprosalic dermalna raztopina povejte svojemu zdravniku, če dojite. Posvetujte se z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete katerokoli zdravilo.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Diprosalic dermalna raztopina ne vpliva na sposobnost upravljanja vozil in strojev.

3. KAKO UPORABLJATI ZDRAVILO DIPROSALIC DERMALNA RAZTOPINA

Pri uporabi zdravila Diprosalic dermalna raztopina natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nanesite nekaj kapljic zdravila Diprosalic dermalna raztopina na prizadeti predel in ga nežno vtrite v kožo ali lasišče, običajno dvakrat na dan (zjutraj in zvečer) oz. po navodilih vašega zdravnika. Zdravljenega predela ne povijajte s povojem ali s čim drugim, razen če vam tako naroči zdravnik. Po uporabi tega zdravila si umijte roke.

Če ste uporabili večji odmerek zdravila Diprosalic dermalna raztopina kot bi smeli

Zdravilo Diprosalic dermalna raztopina uporabljajte le v priporočenem odmerku. Če ste zdravilo uporabili v velikih količinah ali dlje, kot je predpisano, se obrnite na svojega zdravnika.

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Diprosalic dermalna raztopina

Če ste pozabili uporabiti zdravilo Diprosalic dermalna raztopina v skladu z navodili, ga nanesite čimprej, potem pa nadaljujte z rednim režimom odmerjanja.

Zdravnik vam bo svetoval, kdaj prenehajte uporabljati zdravilo Diprosalic dermalna raztopina.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Diprosalic dermalna raztopina neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zelo pogosti:	pojavi se pri več kot 1 od 10 bolnikov
Pogosti:	pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 100 bolnikov
Občasni:	pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 1.000 bolnikov
Redki:	pojavi se pri 1 do 10 bolnikov od 10.000 bolnikov
Zelo redki:	pojavi se pri manj kot 1 bolniku od 10.000 bolnikov
Neznana:	pogostnosti iz razpoložljivih podatkov ni mogoče oceniti

Četudi ni nujno, da se bodo pojavili vsi navedeni neželeni učinki, boste lahko potrebovali zdravniško pomoč, če se pojavijo. Posvetujte se s svojim zdravnikom, če kateri od naslednjih neželenih učinkov traja ali je moteč (neznana pogostnost): občutek pečenja, srbenje, draženje, suha koža, folikulitis (bakterijska okužba lasnega mešička v koži), hipertrichoza (povečana poraščenost), aknam podobni izpuščaji, hipopigmentacija (telo ne proizvaja pigmenta), teleangiektazije (popokane žilice), perioralni dermatitis (kožno vnetje okoli ust), alergijski kontaktni dermatitis (vnetje kože, ki pride v neposreden stik s škodljivo snovjo), maceracija kože (zmehčana koža), atrofija kože (tanjša koža), strije (rožnate črte na koži), miliaria (kožni osip zaradi zamašenih žlez lojnic), sekundarne okužbe.

Otroke in mladostnike, ki morajo uporabljati to zdravilo, naj skrbno spremlja njihov zdravnik, ker se to zdravilo absorbira skozi kožo in lahko vpliva na rast ali povzroči druge neželene učinke.

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA DIPROSALIC DERMALNA RAZTOPINA

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Shranjujte pri temperaturi do 25°C.

Zdravila ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na škatli poleg oznake Uporabno do:. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Ne uporabljajte zdravila Diprosalic dermalna raztopina, če ste opazili kakršnekoli spremembe v videzu mazila.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Diprosalic dermalna raztopina

Zdravilni učinkovini sta: betametazon in salicilna kislina

Pomožne snovi so: izopropilalkohol, natrijev hidroksid, dinatrijev edetat, hidroksipropilmetilceluloza, prečiščena voda

Izgled zdravila Diprosalic dermalna raztopina in vsebina pakiranja

Dermalna raztopina je brezbarvna do rumenkasta.

Zdravilo Diprosalic dermalna raztopina je pakirano v škatle s plastenko po 30 in 100 ml.

Način in režim izdaje zdravila

Rp-Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Schering-Plough Europe, Rue de Stalle 73, Bruselj, Belgija

Izdelovalec

SP Labo N.V., Industriepark 30, B-2220 Heist-op-den-Berg, Belgija in Schering-Plough France, Herouville Saint Clair, Francija.

Navodilo je bilo odobreno

11.06.2010

Za vse morebitne nadaljnje informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom.