

NAVODILO ZA UPORABO

HYZAAR 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
HYZAAR 100 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
FORTZAAR 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
kalijev losartanat in hidroklorotiazid

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Hyzaar/Fortzaar in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Hyzaar/Fortzaar
3. Kako jemati zdravilo Hyzaar/Fortzaar
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Hyzaar/Fortzaar
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO HYZAAR/FORTZAAR IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Zdravilo Hyzaar/Fortzaar je kombinacija antagonista angiotenzina II (losartana) in diuretika (hidroklorotiazida). Angiotenzin II nastaja v telesu. Veže se na receptorje v krvnih žilah in tako povzroči, da se zožijo. Na ta način se krvni tlak zviša. Losartan preprečuje vezavo angiotenzina II na te receptorje in tako povzroči, da se žile sprostijo in se krvni tlak zniža. Hidroklorotiazid deluje tako, da povzroči, da se skozi ledvice izloči več vode in soli. Tudi to pomaga znižati krvni tlak.

Zdravilo Hyzaar/Fortzaar je indicirano za zdravljenje esencialne hipertenzije (visokega krvnega tlaka).

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO HYZAAR/FORTZAAR

Ne jemljite zdravila Hyzaar/Fortzaar

- če ste alergični (preobčutljivi) na losartan, hidroklorotiazid ali katerikoli sestavino zdravila.
- če ste alergični (preobčutljivi) na druge derivate sulfonamida (npr. druge tiazide, nekatera protibakterijska zdravila, kot je ko-trimoksazol; če niste prepričani, vprašajte zdravnika).
- če ste noseči več kot tri mesece (zdravilu Hyzaar/Fortzaar se je bolje izogibati tudi v zgodnji nosečnosti - glejte poglavje o nosečnosti).
- če imate hudo okvaro jeter.
- če imate hudo okvaro ledvic ali vaše ledvice ne tvorijo urina.
- če imate nizko vrednost kalija, nizko vrednost natrija ali visoko vrednost kalcija, ki se jih ne da pozdraviti.
- če imate protin.

Bodite posebno pozorni pri jemanju zdravila Hyzaar/Fortzaar

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če bi lahko zanosili). V zgodnjem obdobju nosečnosti uporaba zdravila Hyzaar/Fortzaar ni priporočljiva. Zdravila Hyzaar/Fortzaar ne smete jemati,

če ste noseči več kot tri mesece, saj lahko uporaba zdravila v tem obdobju resno škoduje vašemu otroku (glejte poglavje o nosečnosti).

Pomembno je, da preden vzamete zdravilo Hyzaar/Fortzaar, poveste zdravniku:

- če so vam kdaj otekali obraz, ustnice, žrelo ali jezik.
- če jemljete diuretike (tablete za odvajanje vode).
- če ste na dieti s hrano z zmanjšano količino soli.
- če ste močno bruhal in/ali imeli hudo drisko.
- če imate srčno popuščanje.
- če imate okvaro jeter (glejte poglavje 2 "Ne jemljite zdravila Hyzaar/Fortzaar").
- če imate zožene arterije, ki vodijo do ledvic (stenoza ledvične arterije) ali vam deluje samo ena ledvica ali pa so vam pred kratkim presadili ledvico.
- če imate zožene arterije (aterosklerozo), angino pektoris (bolečino v prsnem košu zaradi šibkega delovanja srca).
- če imate stenozo aortne ali mitralne zaklopke (zožitev srčnih zaklopk) ali hipertrofično kardiomiopatijo (bolezen, ki povzroča zadebelitev srčne mišice).
- če imate sladkorno bolezen.
- če ste imeli protin.
- če imate ali ste imeli alergijo, astmo ali bolezen, ki povzroča bolečine v sklepih, kožne izpuščaje in zvišano telesno temperaturo (sistemski eritematozni lupus).
- če imate visoko vrednost kalcija ali nizko vrednost kalija ali ste na dieti z zmanjšanim vnosom kalija.
- če boste morali dobiti anestezijo (tudi pri zobozdravniku), boste operirani ali greste na teste delovanja obščitnične žleze, morate zdravniku ali medicinskemu osebju povedati, da jemljete tablete s kalijevim losartanatom in hidroklorotiazidom.
- če imate primarni hiperaldosteronizem (sindrom, povezan s povečanim izločanjem hormona aldosterona iz nadledvične žleze zaradi okvare znotraj žleze).

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta.

Diuretiki, kot je hidroklorotiazid v zdravilu Hyzaar/Fortzaar, lahko medsebojno delujejo z drugimi zdravili.

Pripravki, ki vsebujejo litij, se v kombinaciji z zdravilom Hyzaar/Fortzaar brez natančnega nadzora zdravnika ne smejo uporabljati.

Posebni previdnostni ukrepi (npr. krvni testi) so potrebni, če jemljete dodatke kalija, nadomestke soli, ki vsebujejo kalij, ali zdravila, ki varčujejo kalij, druge diuretike (tablete za odvajanje vode), nekatera odvajala, zdravila za zdravljenje protina, zdravila za nadzor srčnega ritma ali sladkorne bolezni (peroralna zdravila ali insulin).

Pomembno je, da vaš zdravnik ve, če jemljete:

- druga zdravila za zniževanje krvnega tlaka
- steroide
- zdravila za zdravljenje raka
- zdravila za bolečine
- zdravila za zdravljenje glivičnih okužb
- zdravila za artritis
- smole za zdravljenje povišanega holesterola, kot je holestiramin
- zdravila za sprostitev mišic

- uspavala
- opioidna zdravila, kot je morfin
- presorne amine, kot je adrenalin, ali druga zdravila iz iste skupine
- peroralna zdravila za sladkorno bolezen ali insulin

Če boste imeli radiografsko preiskavo z jodovim kontrastnim sredstvom, zdravniku povejte, da jemljete zdravilo Hyzaar/Fortzaar.

Jemanje zdravila Hyzaar/Fortzaar skupaj s hrano in pijačo

Svetujemo vam, da med zdravljenjem s temi tabletami ne pijete alkohola: alkohol in zdravilo Hyzaar/Fortzaar lahko povečata učinek drug drugega.

Velike količine soli v hrani lahko izničijo učinek zdravila Hyzaar/Fortzaar.

Zdravilo Hyzaar/Fortzaar lahko vzamete s hrano ali na tešče.

Nosečnost in dojenje

Nosečnost

Zdravniku morate povedati, če mislite, da ste noseči (ali če bi lahko zanosili). Običajno vam bo zdravnik svetoval, da prekinete z jemanjem zdravila Hyzaar/Fortzaar, še preden zanosite ali takoj, ko ugotovite, da ste noseči. Namesto zdravila Hyzaar/Fortzaar vam bo svetoval drugo zdravilo. V zgodnjem obdobju nosečnosti uporaba zdravila Hyzaar/Fortzaar ni priporočljiva. Zdravila Hyzaar/Fortzaar ne smete jemati, če ste noseči več kot tri mesece, saj lahko uporaba zdravila od tretjega meseca nosečnosti dalje resno škoduje vašemu otroku.

Dojenje

Zdravniku povejte, če dojite ali nameravate dojiti. Zdravila Hyzaar/Fortzaar ne priporočamo doječim materam. Če želite dojiti, vam zdravnik lahko predpiše zdravljenje z drugim zdravilom.

Uporaba pri otrocih in mladostnikih

Izkušenj z uporabo zdravila Hyzaar/Fortzaar pri otrocih nimamo. Zato se zdravila Hyzaar/Fortzaar otrokom ne sme dajati.

Uporaba pri starejših bolnikih

Zdravilo Hyzaar/Fortzaar enako dobro deluje pri večini starejših in mlajših odraslih bolnikov. Oboji ga tudi enako dobro prenašajo. Večina starejših bolnikov potrebuje enak odmerek kot mlajši bolniki.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Na začetku zdravljenja s tem zdravilom ne opravljajte opravil, ki zahtevajo posebno pozornost (na primer vožnje avtomobila ali upravljanja nevarnih strojev), dokler ne veste, kako zdravilo prenašate.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Hyzaar/Fortzaar

Zdravilo Hyzaar/Fortzaar vsebuje laktozo. Če vam je zdravnik povedal, da imate intoleranco za nekatere sladkorje, se pred uporabo tega zdravila posvetujte z zdravnikom.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO HYZAAR/FORTZAAR

Pri jemanju zdravila Hyzaar/Fortzaar natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Zdravnik vam bo predpisal ustrezen odmerek zdravila Hyzaar/Fortzaar glede na vaše stanje in glede na to, ali jemljete še katera druga zdravila. Pomembno je, da nadaljujete z jemanjem zdravila Hyzaar/Fortzaar tako dolgo, kot vam je predpisal zdravnik. Tako vzdržujete enakomeren nadzor krvnega tlaka.

Visok krvni tlak

Običajni odmerek zdravila Hyzaar/Fortzaar za večino bolnikov z visokim krvnim tlakom je 1 tableta Hyzaar 50 mg/12,5 mg na dan za 24-urni nadzor krvnega tlaka. Odmerek se lahko poveča na 2 filmsko obloženi tableti Hyzaar 50 mg/12,5 mg enkrat na dan ali 1 tableto Fortzaar 100 mg/25 mg (večja jakost) na dan. Največji dnevni odmerek sta 2 filmsko obloženi tableti Hyzaar 50 mg/12,5 mg na dan ali ena filmsko obložena tableta Fortzaar 100 mg/25 mg na dan.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Hyzaar/Fortzaar, kot bi smeli

V primeru prevelikega odmerjanja, se takoj posvetujte z zdravnikom, da lahko takoj dobite ustrezno zdravniško pomoč. Prevelik odmerek lahko povzroči padec krvnega tlaka, palpitacije, počasen utrip, spremembe v sestavi krvi in dehidracijo.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Hyzaar/Fortzaar

Zdravilo Hyzaar/Fortzaar poskusite jemati vsak dan tako, kot vam je predpisal zdravnik. Če izpustite odmerek, ne vzemite dvojnega odmerka. Nadaljujte z običajnim jemanjem.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Hyzaar/Fortzaar neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih.

Zdravilo Hyzaar/Fortzaar takoj prenehajte jemati in se posvetujte z zdravnikom ali pa takoj pojdite v najbližjo bolnišnico, če se pri vas pojavi kaj od sledečega:

Huda alergijska reakcija (izpuščaj, srbenje, otekanje obraza, ustnic, otekanje v ustih ali žrelu, ki lahko oteži požiranje ali dihanje). To je resen, vendar redek neželeni učinek, ki prizadene več kot 1 od 10.000 bolnikov, vendar manj kot 1 od 1.000 bolnikov. Lahko da potrebujete nujno zdravniško pomoč ali zdravljenje v bolnišnici.

Poročali so o naslednjih neželenih učinkih:

Pogosti (pojavi se pri manj kot eni od 10 oseb in več kot eni od 100 oseb):

- kašelj, okužba zgornjih dihal, zamašen nos, vnetje sinusov, težave s sinusi
- driska, bolečine v trebuhu, siljenje na bruhanje, slaba prebava
- bolečine v mišicah, mišični krči, bolečine v nogah, bolečine v hrbtu
- nespečnost, glavobol, omotica
- slabotnost, utrujenost, bolečina v prsnem košu
- zvišana količina kalija (ki lahko povzroči nenormalen srčni ritem), znižan hemoglobin
- spremembe v delovanju ledvic, vključno z ledvično odpovedjo
- premalo sladkorja v krvi (hipoglikemija)

Občasni (pojavi se pri manj kot eni od 100 oseb in več kot eni od 1.000 oseb):

- anemija, rdeče ali rjavkaste lise na koži (včasih posebno na stopalih, nogah, rokah in zadnjici, z bolečinami v sklepih, otekanjem dlani in stopal in bolečinami v želodcu), modrice, zmanjšano število belih krvnih celic, motnje strjevanja krvi, zmanjšano število trombocitov
- izguba apetita, povečana količina sečne kisline ali protin, povečana količina sladkorja v krvi, nenormalna vrednost elektrolitov v krvi
- zaskrbljenost, živčnost, panična motnja (ponavljajoči napadi panike), zmedenost, depresija, nenormalne sanje, motnje spanja, zaspanost, motnje spomina
- mravljinčenje ali podobni občutki, bolečine v udih, tresenje, migrena, omedlevica

- zamegljen vid, pekoč občutek ali občutek zbadanja v očeh, vnetje očesne veznice, slabši vid, videnje stvari v rumeni barvi
- zvonjenje, brenčanje, bobnenje v ušesih, vrtoglavica
- nizek krvni tlak, ki je lahko povezan s spremembo položaja (občutek omotičnosti ali slabotnosti, ko vstanete), angina pektoris (bolečina v prsnem košu), nenormalen srčni utrip, možganskožilni dogodek (TIA – mini kap), srčni napad, palpitacije
- vnetje krvnih žil, ki je pogosto povezano s kožnim izpuščajem ali z modricami
- boleče grlo, zasoplost, bronhitis, pljučnica, voda v pljučih (ki otežuje dihanje), krvavitev iz nosu, smrkanje, zamašen nos
- zaprtje, hudo zaprtje, vetrovi, razdražen želodec, želodčni krči, bruhanje, suha usta, vnetje žleze slinavke, zobobol
- zlatenica (porumenitev oči in kože), vnetje trebušne slinavke
- koprivnica, srbenje, vnetje na koži, izpuščaj, rdečina na koži, občutljivost na svetlobo, suha koža, zardevanje, potenje, izpadanje las
- bolečine v rokah, ramenih, kolkih, kolenih in drugih sklepih, otekanje sklepov, okorelost, šibkost mišic
- pogosto uriniranje (tudi ponoči), nenormalno delovanje ledvic, vključno z vnetjem ledvic, vnetje sečil, sladkor v urinu
- zmanjšan libido, impotenca
- otekanje obraza, lokalizirano otekanje (edem), zvišana telesna temperatura

Redki (pojavi se pri več kot 1 od 10.000 ter manj kot 1 od 1.000 bolnikov):

- hepatitis (vnetje jeter), nenormalni izvidi delovanja jeter

Neznana:

- gripi podobni simptomi
- nepojasnjena bolečina v mišicah, skupaj s temno obarvanim urinom (rabdomioliza)
- nizke vrednosti natrija v krvi (hiponatriemija)
- splošno slabo počutje

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA HYZAAR/FORTZAAR

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Hyzaar/Fortzaar ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini. Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Pretisni omoti

Zdravilo Hyzaar/Fortzaar shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo in vlago. Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

Plastenka

Shranjujte v originalni ovojnini za zagotovitev zaščite pred svetlobo. Plastenka mora biti tesno zaprta za zagotovitev zaščite pred vlago. Plastenko shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Hyzaar/Fortzaar

Zdravilni učinkovini sta kalijev losartanat in hidroklorotiazid.

Hyzaar 50 mg/12,5 mg kot zdravilni učinkovini vsebuje 50 mg kalijevega losartanata in 12,5 mg hidroklorotiazida.

Hyzaar 100 mg/12,5 mg kot zdravilni učinkovini vsebuje 100 mg kalijevega losartanata in 12,5 mg hidroklorotiazida.

Fortzaar 100 mg/25 mg kot zdravilni učinkovini vsebuje 100 mg kalijevega losartanata in 25 mg hidroklorotiazida.

Hyzaar 50 mg/12,5 mg, Hyzaar 100 mg/12,5 mg in Fortzaar 100 mg/25 mg vsebujejo naslednje pomožne snovi:

mikrokristalno celulozo, laktozo monohidrat, predgeliran koruzni škrob, magnezijev stearat, hidroksipropilcelulozo, hipromelozo.

Hyzaar 50 mg/12,5 mg vsebuje 4,24 mg (0,108 mEq) kalija. Hyzaar 100 mg/12,5 mg in Fortzaar 100 mg/25 mg vsebujeta 8,48 mg (0,216 mEq) kalija.

Hyzaar 50 mg/12,5 mg in Fortzaar 100 mg/25 mg vsebujeta tudi titanov dioksid (E171), kinolinsko rumeno (E104) in karnauba vosek (E903).

Hyzaar 100 mg/12,5 mg vsebuje tudi: titanov dioksid (E171) in karnauba vosek (E903).

Izgled zdravila Hyzaar/Fortzaar in vsebina pakiranja

Hyzaar 50 mg/12,5 mg je na voljo v obliki rumenih, ovalnih filmsko obloženih tablet z oznako 717 na eni strani in z razdelilno zarezo ali brez na drugi strani. Razdelilna zareza je namenjena delitvi tablete za lažje požiranje in ne delitvi na dva enaka odmerka.

Hyzaar 100 mg/12,5 mg je na voljo v obliki belih, ovalnih filmsko obloženih tablet z oznako 745 na eni strani in brez oznake na drugi strani.

Fortzaar 100 mg/25 mg je na voljo v obliki svetlo rumenih, ovalnih filmsko obloženih tablet z oznako 747 na eni strani in brez oznake na drugi strani.

Hyzaar/Fortzaar je na voljo v naslednjih pakiranjih:

Hyzaar 50 mg/12,5 mg: PVC/PE/PVDC pretisni omoti s prevleko iz aluminijaste folije v škatlah po 4, 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 84, 98 ali 280 tablet in enoodmerna pakiranja po 28, 56 in 98 tablet za bolnišnično uporabo. HDPE plastenke po 100 tablet.

Hyzaar 100 mg/12,5 mg: PVC/PE/PVDC pretisni omoti s prevleko iz aluminijaste folije v škatlah po 14, 15, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 ali 280 tablet. HDPE plastenke po 100 tablet.

Fortzaar 100 mg/25 mg: PVC/PE/PVDC pretisni omoti s prevleko iz aluminijaste folije v škatlah po 7, 14, 28, 30, 50, 56, 84, 90, 98 ali 280 tablet in enoodmerna pakiranja po 28, 56 in 98 tablet za bolnišnično uporabo. HDPE plastenke po 100 tablet.

Na trgu ni vseh navedenih pakiranj.

Način izdaje zdravila Hyzaar/Fortzaar

Predpisovanje in izdaja zdravila je le na recept.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
Šmartinska cesta 140
1000 Ljubljana
Slovenija

Izdelovalec zdravila

Merck Sharp & Dohme B.V.
Waarderweg 39
Postbus 581
2031 BN Haarlem
Nizozemska

To zdravilo je v državah članicah EGP odobreno pod naslednjimi imeni:

Avstrija	COSAAR Plus - Filmdabletten
Avstrija	FORTZAAR-Filmdabletten
Belgija	COZAAR PLUS FORTE 100 MG/25 MG
Belgija	COZAAR PLUS 50 MG/12,5 MG
Belgija	LOORTAN PLUS FORTE 100 MG/25 MG
Belgija	LOORTAN PLUS 50 MG/12,5 MG
Ciper	FORTZAAR
Ciper	HYZAAR
Danska	COZAAR Comp.
Danska	COZAAR Comp Forte
Danska	COZAAR Comp 100 mg / 12,5 mg
Danska	FORTZAAR
Estonija	HYZAAR
Estonija	FORTZAAR
Finska	COZAAR Comp
Finska	COZAAR Comp Forte
Francija	FORTZAAR 100 mg/25 mg film-coated tablets
Francija	HYZAAR 100 mg/25 mg film-coated tablets
Francija	FORTZAAR 50 mg/12,5 mg film-coated tablets
Francija	HYZAAR 50 mg/12,5 mg film-coated tablets
Francija	FORTZAAR 100 mg/12,5 mg film-coated tablets
Grčija	HYZAAR
Grčija	HYZAAR Forte
Grčija	HYZAAR Extra Forte
Irska	COZAAR Comp 50mg/12.5mg film-coated tablets
Irska	COZAAR Comp 100mg/12.5mg film-coated tablets

Irska	COZAAR Comp 100mg/25mg film-coated tablets
Italija	HIZAAR 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film
Italija	HIZAAR 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film
Italija	FORZAAR 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film
Italija	NEO-LOTAN PLUS 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film
Italija	NEO-LOTAN PLUS 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film
Italija	LOSAZID 50 mg + 12,5 mg compresse rivestite con film
Italija	LOSAZID 100 mg + 25 mg compresse rivestite con film
Litva	HYZAAR 50 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės
Litva	FORTZAAR 100 mg/12,5 mg plėvele dengtos tabletės
Litva	FORTZAAR 100 mg/25 mg plėvele dengtos tabletės
Luksemburg	COZAAR PLUS FORTE 100 MG/25 MG
Luksemburg	COZAAR PLUS 50 MG/12,5 MG
Luksemburg	LOORTAN PLUS FORTE 100 mg/25 mg
Luksemburg	LOORTAN PLUS 50 mg/12,5 mg
Madžarska	HYZAAR 50/12.5 mg
Madžarska	HYZAAR 100/12.5 mg
Madžarska	HYZAAR Forte 100/25 mg
Malta	COZAAR Comp 50/12.5 mg pilloli miksija b'rita
Malta	COZAAR Comp 100/25 mg pilloli miksija b'rita
Malta	COZAAR Comp 100/12,5 mg pilloli miksija b'rita
Nemčija	LORZAAR PLUS 50/12,5 mg Filmtabletten
Nemčija	FORTZAAR 100/25 mg Filmtabletten
Nemčija	LORZAAR PLUS forte 100/12,5 mg Filmtabletten
Nizozemska	COZAAR Plus 100/12,5
Nizozemska	FORTZAAR 100/25
Nizozemska	HYZAAR 50/12,5
Poljska	HYZAAR
Poljska	HYZAAR FORTE
Portugalska	COZAAR Plus
Portugalska	FORTZAAR
Portugalska	SIAARA
Portugalska	LORTAAN Plus
Portugalska	Losartan + Hidroclorotiazida Frosst
Romunija	HYZAAR 50 mg/12,5 mg, comprimate filmate
Romunija	FORTZAAR 100/25 mg, comprimate filmate
Slovenija	HYZAAR 50 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
Slovenija	HYZAAR 100 mg/12,5 mg filmsko obložene tablete
Slovenija	FORTZAAR 100 mg/25 mg filmsko obložene tablete
Španija	COZAAR Plus
Španija	FORTZAAR
Švedska	COZAAR Comp 50 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter
Švedska	COZAAR Comp 100 mg/12,5 mg filmdragerade tabletter
Švedska	COZAAR Comp Forte 100 mg/25 mg filmdragerade tabletter
Velika Britanija	COZAAR-COMP 50/12.5MG FILM COATED TABLETS
Velika Britanija	COZAAR-COMP 100/25MG FILM COATED TABLETS

Velika Britanija	COZAAR-Comp 100 mg/12.5 mg Film-coated tablets
Islandija	COZAAR-COMP 50/12.5MG
Islandija	COZAAR-COMP Forte
Islandija	COZAAR-COMP 100/12.5MG
Norveška	COZAAR Comp
Norveška	COZAAR Comp Forte

Navodilo je bilo odobreno: 12/2011