

NAVODILO ZA UPORABO

Victrelis® 200 mg trde kapsule boceprevir

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Če imate dodatna vprašanja, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
- Zdravilo je bilo predpisano vam osebno in ga ne smete dajati drugim. Njim bi lahko celo škodovalo, čeprav imajo znake bolezni, podobne vašim.
- Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

Navodilo vsebuje:

1. Kaj je zdravilo Victrelis in za kaj ga uporabljamo
2. Kaj morate vedeti, preden boste vzeli zdravilo Victrelis
3. Kako jemati zdravilo Victrelis
4. Možni neželeni učinki
5. Shranjevanje zdravila Victrelis
6. Dodatne informacije

1. KAJ JE ZDRAVILO VICTRELIS IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

Kaj je zdravilo Victrelis

Zdravilo Victrelis vsebuje zdravilno učinkovino boceprevir, ki pomaga zdraviti okužbo s hepatitisom C tako, da ustavi razmnoževanje virusa. Zdravilo Victrelis je treba vedno uporabljati skupaj z dvema drugima zdraviloma: ti zdravili se imenujeta peginterferon alfa in ribavirin. Zdravila Victrelis se ne sme uporabljati samega.

Za kaj uporabljamo zdravilo Victrelis

Zdravilo Victrelis se v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom uporablja za zdravljenje kroničnega hepatitisa C (to okužbo imenujemo tudi okužba s HCV) pri odraslih, starih 18 let ali več. Zdravilo Victrelis se lahko uporablja pri odraslih, ki zaradi okužbe s HCV še niso bili zdravljeni, in pri odraslih, ki so prej že prejeli zdravila, imenovana "interferoni" in "pegilirani interferoni".

Kako deluje zdravilo Victrelis

Zdravilo Victrelis deluje tako, da zmanjša količino HCV v vašem telesu.

2. KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE VZELI ZDRAVILO VICTRELIS

Ne jemljite zdravila Victrelis v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom:

- če ste **alergični** (preobčutljivi) na boceprevir ali katerikoli sestavino zdravila Victrelis (sestavine so naštet v poglavju 6),
- če ste **noseči**,
- če imate resne težave z **jetri** (poleg hepatitisa C),
- če imate bolezen, imenovano "avtoimunski hepatitis",
- če jemljete bepridil, pimozid, peroralni midazolam, peroralni triazolam, zdravila ergotskega tipa (npr. dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin ali metilergonovin), lumefantrin, halofantrin ali zaviralce tirozin-kinaze.

Ne vzemite zdravila Victrelis, če kaj od naštetega velja za vas. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete zdravilo Victrelis.
Opozorilo: Preden začnete jemati zdravilo Victrelis, prosimo, preberite tudi poglavje "Ne jemljite zdravila" v navodilu za uporabo za peginterferon alfa in ribavirin.

Bodite posebno pozorni pri uporabi zdravila Victrelis

Preden vzamete to zdravilo, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom:

- če ste kdaj imeli težave s krvjo, kot je **anemija** (pomanjkanje zdravih rdečih krvnih celic, ki prenašajo kisik po telesu),
- če ste kdaj imeli težave s krvjo, kot je nevtropenija (pomanjkanje določene vrste belih krvnih celic). Nevtropenija prizadane zmožnost telesa za borbo proti okužbam.
- če imate druge težave **z jetri** poleg okužbe s hepatitisom C,
- če pri vas predhodno zdravljenje ni bilo uspešno in so vam povedal, da ste popolnoma neodzivni bolnik,
- če imate **HIV** (virus humane imunske pomanjkljivosti) ali če ste kdaj imeli kakšne druge težave z imunskim sistemom,
- če ste bili prejemnik presajenega organa,
- če imate hepatitis C drugega genotipa kot 1,
- če je bilo pri vas predhodno zdravljenje z zaviralcem HCV proteaze neuspešno,
- če imate ali ima kdo iz vaše družine nepravilen srčni utrip, še posebej stanje, imenovano "podaljšanje QT intervala",
- če imate nizko koncentracijo kalija v krvi (hipokaliemijo)

Če kaj od naštetega velja za vas (ali če niste prepričani), se pred jemanjem zdravila Victrelis posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Preiskave

Zdravnik vas bo napotil na redne preiskave krvi, ki jih treba opraviti iz več razlogov:

- da bo zdravnik vedel, ali zdravljenje pri vas deluje,
- za pomoč zdravniku pri presoji, kako dolgo se morate zdraviti z zdravilom Victrelis.

Jemanje drugih zdravil

Obvestite svojega zdravnika ali farmacevta, če jemljete ali ste pred kratkim jemali katerokoli drugo zdravilo, tudi če ste ga dobili brez recepta. To velja tudi za zdravila rastlinskega izvora.

Še zlasti ne vzemite zdravila Victrelis, če jemljete katero od naslednjih zdravil:

- bepridil – uporablja se za zdravljenje težav s srcem,
- pimozid – uporablja se za zdravljenje težav z duševnim zdravjem,
- peroralni midazolam ali peroralni triazolam – pomirjevalo (sedativ), ki ga vzamete skozi usta,
- zdravila ergotskega tipa, npr. dihidroergotamin, ergonovin, ergotamin ali metilergonovin – uporabljajo se za zdravljenje migrene in glavobolov v rafalih,
- lumefantrin in halofantrin - zdravili proti malariji,
- zaviralce tirozin-kinaze - uporabljajo se kot zdravila proti raku.

Ne vzemite zdravila Victrelis, če jemljete katerokoli izmed zgoraj naštetih zdravil. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom, preden vzamete zdravilo Victrelis.

Prav tako morate svojemu zdravniku ali farmacevtu povedati, če jemljete katera od naslednjih zdravil:

- kontraceptive (ki vsebujejo drospirenon)
- zdravila, ki inducirajo CYP3A4 (kot so rifampicin, karbamazepin, fenobarbital, fenitoin)
- antiaritmike – amiodaron, kinidin
- protimikrobna zdravila – pentamidin
- nekatere nevroleptike

- protiglivična zdravila – ketokonazol, itrakonazol, posakonazol, virikonazol
- nenukleozidne zaviralce reverzne transkriptaze – efavirenz
- zaviralec HIV proteaze – ritonavir
- zaviralec integraze – raltegravir
- pomirjevala, ki jih dobite v žilo – benzodiazepine (npr. alprazolam, midazolam, triazolam)
- imunosupresive – takrolimus, ciklosporin
- statine – simvastatin ali atorvastatin
- metadon

Nosečnost in dojenje

Zaradi uporabe zdravila Victrelis z ribavirinom ženska med zdravljenjem in še 6 mesecev po koncu zdravljenja ne sme zanositi. Zdravljeni bolniki/bolnice in njihove partnerke/partnerji morajo v primeru uporabe boceprevirja v kombinaciji s peginterferonom alfa in ribavirinom uporabljati dva učinkovita načina kontracepcije.

Mogoče je, da se boceprevir izloča v materino mleko pri človeku. Če dojite, vam bo zdravnik svetoval, da prenehate z dojenjem ali prenehate jemati zdravilo Victrelis, dokler dojite.

Opozorilo: Preden začnete jemati zdravilo Victrelis, prosimo, preberite tudi poglavje "Nosečnost in dojenje" v navodilih za uporabo za peginterferon alfa in ribavirin.

Vpliv na sposobnost upravljanja vozil in strojev

Zdravilo Victrelis ne vpliva na sposobnost vožnje in upravljanja s stroji. Vendar pa lahko kombinacija zdravila Victrelis ter peginterferona alfa in ribavirina povzroči utrujenost, omotico, občutek vrtenja v glavi, spremembe krvnega tlaka, zmedenost ali težave z vidom. Če se vam to zgodi, ne vozite in ne uporabljajte orodij oziroma strojev.

Pomembne informacije o nekaterih sestavinah zdravila Victrelis

Zdravilo Victrelis vsebuje laktozo (vrsto sladkorja). Če vam je zdravnik povedal, da ne prenašate oz. ne prebavljate nekaterih sladkorjev (imate intoleranco za nekatere sladkorje), tj. imate npr. laponsko obliko zmanjšane aktivnosti laktaze ali malabsorbcijo glukoze-galaktoze, se z njim posvetujte, preden vzamete to zdravilo.

3. KAKO JEMATI ZDRAVILO VICTRELIS

Pri jemanju zdravila Victrelis natančno upoštevajte zdravnikova navodila. Če ste negotovi, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Koliko zdravila morate vzeti

Običajen odmerek zdravila Victrelis je 4 kapsule trikrat na dan (skupaj 12 kapsul na dan). Kapsule vzemite zjutraj, popoldan in zvečer ob obroku ali z lahkim prigrizkom. Uporaba brez hrane lahko bistveno zmanjša možnosti za uspeh zdravljenja.

Kako jemati to zdravilo?

- Odlepите zadnjo stran pretisnega omota, da boste razkrili kapsulo – ne potiskajte kapsule skozi pretisni omot, ker jo tako lahko poškodujete.
- Zdravilo zaužijte.
- Zdravilo morate vzeti ob obroku ali z lahkim prigrizkom.

Opozorilo: Preden začnete jemati zdravilo Victrelis, prosimo, preberite tudi poglavje "MOŽNI NEŽELENI UČINKI" v navodilih za uporabo za peginterferon alfa in ribavirin.

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Victrelis, kot bi smeli

Če ste vzeli večji odmerek zdravila Victrelis, kot bi smeli, se morate takoj posvetovati z zdravnikom ali iti v ambulanto za nujno medicinsko pomoč najbližje bolnišnice.

Če ste pozabili vzeti zdravilo Victrelis

- Če ste pozabili vzeti odmerek, do naslednjega odmerka pa je več kot 2 uri, vzemite pozabljeni odmerek s hrano. Potem nadaljujte z jemanjem kapsul kot po navadi.
 - Če pa je do naslednjega odmerka manj kot 2 uri, pozabljeni odmerek izpuscite.
 - Ne vzemite dvojnega odmerka, da bi nadoknadili izpuščeni odmerek.
- Če imate kakšno vprašanje o tem, kako ravnati, se posvetujte z zdravnikom.

Če ste prenehali jemati zdravilo Victrelis

Ne prenehajte jemati zdravila Victrelis, če vam tega ne naroči zdravnik.

Če imate dodatna vprašanja o uporabi tega zdravila, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

4. MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Kot vsa zdravila ima lahko tudi zdravilo Victrelis neželene učinke, ki pa se ne pojavijo pri vseh bolnikih. Med uporabo tega zdravila se lahko pojavijo naslednji neželeni učinki:

Prenehajte jemati zdravilo Victrelis in takoj obiščite zdravnika, če opazite katerega od naslednjih resnih neželenih učinkov – morda boste potrebovali nujno zdravljenje:

- težave z dihanjem, piskajoče dihanje ali koprivnico – to so znaki alergijske reakcije.

Med drugimi neželenimi učinki so:

Zelo pogosti (pojavijo se pri več kot 1 od 10 bolnikov)

Splošno: glavobol, mrzlica, zvišana telesna temperatura, siljenje na bruhanje (navzea), gripi podobni simptomi, omotica, nespečnost, slab apetit, hujšanje, težko dihanje (kratka sapa)

Usta, nos in žrelo: kašelj, suha usta, čuden okus

Koža, lasje in dlake: suha koža, srbenje, izpuščaj, izpadanje ali razredčenje las

Sklepi in mišice: nenavadna šibkost, boleči, otekli sklepi, mišične bolečine, ki niso posledica telesnega napora

Želodec in črevo: driska, bruhanje

Duševne bolezni: občutek tesnobe, občutek globoke žalosti ali ničvrednosti (depresija), razdražljivost, napetost in nemir

Kri: zmanjšano število rdečih krvnih celic – med znaki so lahko utrujenost, glavoboli, kratka sapa pri naporu, majhno število belih krvnih celic – med znaki so lahko pogostejše pojavljanje okužb kot po navadi – vključno z zvišano telesno temperaturo, hudo mrzlico, vnetjem žrela ali razjedami v ustih

Pogosti (pojavijo se pri manj kot 1 od 10 bolnikov)

Splošno: tresenje, omedlevica, težko dihanje, pomanjkanje energije, žeja, težave s spanjem, utripajoč glavobol, splošno slabo počutje, občutek vrtoglavice

Oči in ušesa: suhost oči, zvonjenje v ušesih, spremembe vida

Usta, nos in žrelo: bolečina v ustih, zobobol, bolečina pri požiranju, krvavitev iz nosu, zamašen nos, spremembe voaha, boleče in privzdignjene lehe v ustih, občutek velike žeje ter suha usta ali suha koža, oteklost ščitnice, vratu ali glasilk, bolečnost ali oteklost v ustih, pekoč občutek na jeziku, občutek napetosti in polnosti v nosu, licih in za očmi – včasih z utripajočo bolečino, zvišano telesno temperaturo ali zamašenim nosom (sinuzitis)

Koža, lasje in dlake: herpes, mravljinčenje ali omrtvičenost kože, zmanjšan občutek ali zaznava dotika, kožni izpuščaj, lisast kožni izpuščaj, rdeča koža, rdeč privzdignjen

kožni izpuščaj, včasih z gnojnimi mehurji, vroča, občutljiva in rdeča koža, včasih z zvišano telesno temperaturo in mrzlico, kožna bolezen z debelimi rdečimi lisami – pogosto s srebrnkastimi luskami

Sklepi in mišice: spazem mišic, utrujenost, mišična šibkost, občutek hladu, bolečine v hrbtu, bolečine v vratu, bolečina v rokah ali nogah

Želodec in črevo: bolečina v želodcu in zgornji desni strani trebuha ali hrbta, pekoč občutek v želodcu, razdražen želodec, napihnjenost, spahovanje

Zadnjik: vetrovi (flatulenca), zlata žila (hemoroidi), težave pri iztrebljanju blata (zaprtje)

Sečila: pogostejše uriniranje kot po navadi

Spolni organi: zmanjšanje spolnega poželjenja, težave z doseganjem ali ohranjanjem erekcije

Duševne bolezni: spremembe razpoloženja, občutek vznemirjenosti, poslabšanje spomina, težave s koncentracijo

Prsni koš: težko dihanje, nelagodje v prsnem košu, bolečina v prsnem košu, občutek teže v prsnem košu s težkim dihanjem ali piskajočim dihanjem

Srce in obtočila: hitro ali neredno bitje srca, visok ali nizek krvni tlak

Kri: zmanjšanje števila trombocitov – med znaki so lahko krvavitve ali hitrejše pojavljanje modric kot po navadi

Občasni (pojavi se pri manj kot 1 od 100 bolnikov)

Splošno: omedlevica, omotičnost, artritis, povečana nagnjenost h krvavitvam, otekle bezgavke na vratu, v pazduhah ali dimljah, izrazita pekoča ali zbadajoča bolečina, večja občutljivost za svetlobo, zvok, dotike ali okuse hrane

Oči in ušesa: pordelo oko, bolečine v očeh, gluhost, naglušnost, oteklost okrog vek, močnejše solzenje, tekoč izcedek iz očesa ali ušesa, nenormalen občutek okrog očesa, rdeče lise na očesni beločnici

Usta, nos in žrelo: hripavost, suho žrelo ali ustnice, boleče ali krvaveče dlesni, občutljivost zob ali zobobol, oteklost jezika, spremenjena barva jezika ali razjede na jeziku, mehurji na jeziku, huda bolečina pri požiranju, bolečina v prsnem košu blizu pljuč, bolečina v prsnem košu, ki se poslabša ob globokem vdihu, nekontrolirano slinjenje, porumenelost očesne beločnice ali kože,

Koža, lasje in dlake: koprivnica, močnejše znojenje, odprta razjeda, neprenašanje vročine, izrazito rdeč obraz, bled obraz, porumenelost kože, izpuščaj zaradi sončne svetlobe, rana, ki se ne celi normalno

Stopala, dlani, noge ali roke: bolečina, omrtničenost, mravljinčenje ali zbadanje, krvni strdek v veni, občutek hladu v roki ali nogi

Želodec in črevo: bolečina v spodnjem delu trebuha, vnetje trebušne slinavke

Sečila: bolečine pri uriniranju, pekoč občutek ali težave z uriniranjem, vstajanje večkrat na noč zaradi uriniranja

Danka ali zadnjik: srbenje zadnjika, nezmožnost iztrebljanja blata ali spremenjena barva blata, pogostejše iztrebljanje blata, hemoroidi ali krvavitev iz zadnjika

Spolni organi: izostanek menstruacije, močna ali dolgotrajna menstruacija, krvavitev iz maternice

Duševne bolezni: jeza, sovražnost ali sovražno obnašanje, grozeče obnašanje, težave z zlorabo substanc, nenormalno obnašanje, občutek zmedenosti, razmišljanje o samomoru, nenaden močan strah ali bojazen, preganjavica, težave pri reševanju problemov

Mišice: bolečina v kosteh, lokalna ali široko razširjena bolečina

Prsni koš: pljučnica

Srce in obtočila: nenormalno ali hitro bitje srca, bolezen srca zaradi slabega pretoka krvi skozi srce

Kri: visoka koncentracija kalija v krvi

Redki (pojavi se pri manj kot 1 od 1.000 bolnikov)

Splošno: težko dihanje in požiranje, tumor ščitnice, okužba krvi, oteklost ali bule v telesnih organih, bolezen, ki povzroči naraščajočo ohromelost mišic, bolezen možganov – med

znaki so lahko glavobol in zvišana telesna temperatura, ohromelost dela telesa, tog vrat ali občutljivost na svetlobo

Oči in ušesa: bolečina v ušesu, dvojen vid ali zamegljen vid

Koža, lasje in dlake: pordelost kože, bakterijska okužba kože

Želodec in črevo: težave s prebavljanjem hrane, bruhanje krvi, driska, krči ali hude bolečine v trebuhu

Spolni organi: zmanjšano število semenčic

Duševne bolezni: spremembe razpoloženja, občutek, da vam življenje razpada, videnje, občutenje ali slišanje stvari, ki niso resnične (halucinacije), misli na samomor, poskus samomora, občutek velike sreče (manija) in potem občutek globoke žalosti ali ničvrednosti

Prsni koš: kratka sapa v leže, resna okužba pljuč, npr. pljučnica, ostre bolečine v prsnem košu, ki se poslabšajo pri dihanju, bolečina za prsnico, ki se lahko širi v vrat in rame

Srce in obtočila: srčni infarkt, prenehanje dihanja, krvni strdek v nogi ali roki, zmanjšan pretok krvi v delih možganov

Če katerikoli neželeni učinek postane resen ali če opazite katerikoli neželeni učinek, ki ni omenjen v tem navodilu, obvestite svojega zdravnika ali farmacevta.

5. SHRANJEVANJE ZDRAVILA VICTRELIS

Zdravilo shranjujte nedosegljivo otrokom!

Zdravila Victrelis ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini poleg oznake "Uporabno do" ali "EXP". Datum izteka roka uporabnosti se nanaša na zadnji dan navedenega meseca.

Shranjevanje v lekarni

Shranjujte v hladilniku (2 °C – 8 °C).

Shranjevanje pri bolniku

- Shranjujte v hladilniku (2 °C - 8 °C) do izteka roka uporabnosti.

ALI

- Shranjujte zunaj hladilnika pri temperaturi do 30 °C do največ 3 mesece in do izteka roka uporabnosti. Po tem je treba zdravilo zavreči.

Shranjujte v originalnem pretisnem omotu za zagotovitev zaščite pred vlago.

Zdravila ne smete odvreči v odpadne vode ali med gospodinjske odpadke. O načinu odstranjevanja zdravila, ki ga ne potrebujete več, se posvetujte s farmacevtom. Takšni ukrepi pomagajo varovati okolje.

6. DODATNE INFORMACIJE

Kaj vsebuje zdravilo Victrelis

- Zdravilna učinkovina je boceprevir. Ena trda kapsula vsebuje 200 mg boceprevirja.
- Pomožne snovi so natrijev lavrilsulfat, mikrokristalna celuloza, laktoza monohidrat, premreženi natrijev karmelozat, predgelirani škrob, magnezijev stearat, rumeni železov oksid (E 172), rdeči železov oksid (E 172), titanov dioksid (E 171), želatina in šelak.

Izgled zdravila Victrelis in vsebina pakiranja

Zgornji del trde kapsule je rumenkasto-rjav in ima z rdečim črnilom natisnjeno oznako "MSD", spodnji del kapsule pa je sivo bel in ima z rdečim črnilom natisnjeno kodo "314".

Odlepni pretisni omoti, ki vsebujejo 12 trdih kapsul (pretisni omot s 3 x 4 kapsulami).
Multi pakiranja, ki vsebujejo 336 (4 zgibanke (notranje škatle) po 84) trdih kapsul.

Imetnik dovoljenja za promet

Merck Sharp & Dohme Ltd
Hertford Road, Hoddesdon
Hertfordshire
EN11 9BU
Velika Britanija

Izdelovalec

S-P Labo NV
Industriepark 30
B-2220 Heist-op-den-Berg
Belgija

Navodilo je bilo odobreno: 08/2011.

Podrobne informacije o zdravilu so objavljene na spletni strani Evropske agencije za zdravila
<http://www.ema.europa.eu/>.

Za vse dodatne informacije o tem zdravilu se lahko obrnete na predstavništvo imetnika dovoljenja za promet z zdravilom:

Belgique/België/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38693 (+32 (0)2 7766211)
dpoc_belux@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL
Tél/Tel: 0800 38693 (+32 (0)2 7766211)
dpoc_belux@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД
Тел.: +359 2 819 3737
info-msdbg@merck.com

Magyarország

MSD Magyarország Kft.
Tel.: +361 888 53 00
hungary_msd@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.
Tel.: +420 233 010 111
msd_cr@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Tel: +357 22866700
malta_info@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS
Tlf: +45 4482 4000
dkmail@merck.com

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.
Tel: +31 (0) 800 9999000
(+31 (0) 23 5153153)
medicalinfo.nl@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH
Tel: 0800 673 673 673
(+49 (0) 89 4561 2612)
e-mail@msd.de

Norge

MSD (Norge) AS
Tlf: +47 32 20 73 00
msdnorge@msd.no

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ
Tel.: +372 6144 200
msdeesti@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
Tel: +43 (0) 1 26 044
msd-medizin@merck.com

Ελλάδα

MSD A.Φ.B.E.E.
Τηλ: +30 210 98 97 300
cora.greece.gragcm@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
Tel: +34 91 321 06 00
msd_info@merck.com

France

MSD France
Tél: + 33-(0)1 80 46 40 40

Ireland

Merck Sharp and Dohme Ireland (Human Health)
Limited
Tel: +353 (0)1 2998700
medinfo_ireland@merck.com

Ísland

Vistor hf.
Sími: +354 535 7000
ISmail@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.
Tel: +39 06 361911
doccen@merck.com

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
Τηλ: +800 00 673
(+357 22866700)
cyprus_info@merck.com

Latvija

SIA “Merck Sharp & Dohme Latvija”
Tel: +371 67364 224
msd_lv@merck.com

Lietuva

UAB “Merck Sharp & Dohme”
Tel.: +370 5 278 02 47
msd_lietuva@merck.com

Polska

MSD Polska Sp.z o.o.
Tel.: +48 22 549 51 00
msdpolska@merck.com

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda
Tel: +351 21 4465700
clic@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.
Tel: + 4021 529 29 00
msdromania@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila
d.o.o.
Tel: + 386 1 5204201
msd_slovenia@merck.com

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.
Tel.: +421 2 58282010
msd_sk@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy
Puh/Tel: +358 (0) 9 804650
info@msd.fi

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
Tel: 46 77 5700488
medicinskinfo@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp and Dohme Limited
Tel: +44 (0) 1992 467272
medicalinformationuk@merck.com